



## Carbimazole

Date de création  
30 Avril 2018

Version 1

Page 1 sur 1

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

Si vous avez des questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit, ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

### 1. QU'EST-CE QUE *LE CARBIMAZOLE* ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

#### 1.1 Indications thérapeutiques

Le carbimazole est un antithyroïdien. Il est indiqué dans le traitement des hyperthyroïdies. Il peut être utilisé dans d'autres pathologies. Demandez au médecin qui suit votre enfant.

### 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER *LE CARBIMAZOLE* ?

#### 2.1 Contre-indications et précautions d'emploi

Ce médicament ne doit pas être utilisé si votre enfant souffre d'insuffisance hépatique, d'une maladie grave du sang, ou d'un cancer de la thyroïde.

En cas d'apparition de fièvre, d'angine, d'ulcères de la bouche (inflammation de la muqueuse buccale), d'hématomes, de saignements ou de malaise, consultez le médecin qui suit votre enfant.

Ces symptômes peuvent traduire une baisse brutale du nombre de certaines cellules sanguines nécessitant la réalisation d'une prise de sang (numération formule sanguine) et l'arrêt du traitement.

Une surveillance de la numération formule sanguine est nécessaire avant le traitement puis de manière régulière pendant le traitement.

En cas d'apparition de douleurs au niveau du haut de l'abdomen, d'une anorexie ou de démangeaisons sur l'ensemble du corps, vous devez consulter le médecin qui suit votre enfant. Ces symptômes peuvent traduire une perturbation du fonctionnement de son foie.

Le traitement ne doit pas être interrompu sans l'avis du médecin qui suit votre enfant.

### 2.2 Interactions avec d'autres médicaments, aliments, boissons

San objet.

Dans tous les cas, si votre enfant prend ou a pris d'autres médicaments, avec ou sans ordonnance, signalez-le à votre médecin ou votre pharmacien.

### 3. COMMENT UTILISER *LE CARBIMAZOLE* ?

#### 3.1 Instructions pour un bon usage

Avaler les gélules avec un grand verre d'eau.

Les gélules peuvent être ouvertes et leur contenu mélangé avec un peu d'eau, de lait, de compote ou de yaourt.

#### 3.2 Posologie, mode et/ou voie d'administration, fréquence d'administration et durée de traitement

Voie orale.

Concernant la posologie et la durée du traitement, se référer à la prescription médicale de votre enfant. En cas d'oubli, ne pas doubler la dose.

### 4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

#### 4.1 Description des effets indésirables

Comme tous les médicaments, *LE CARBIMAZOLE* est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet, tels que : réaction allergique cutanée, fièvre, rougeurs, douleurs articulaires, courbatures, baisse du nombre de globules blancs dans le sang, maux de tête, nausées, saignements, hématomes, augmentation du volume du goître (signe d'un surdosage).

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

### 5. COMMENT CONSERVER *LE CARBIMAZOLE* ?

#### 5.1 Conditions de conservation

Tenir hors de portée des enfants.

Conserver à température ambiante.

Conserver dans un endroit sec.

#### 5.2 Péremption

3 mois