



Fludrocortisone

Date de création
31 Juillet 2017

Version 1

Page 1 sur 1

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
Si vous avez des questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
Ce médicament vous a été personnellement prescrit, ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre.
Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

1. QU'EST-CE QUE LA FLUDROCORTISONE ET DANS QUEL CAS EST-ELLE UTILISEE ?

Indications thérapeutiques

Ce médicament est un minéralocorticoïde indiqué dans le traitement de l'insuffisance corticosurrénalienne primaire quelle qu'en soit l'étiologie, ou secondaire, en association avec un glucocorticoïde.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER LA FLUDROCORTISONE ?

Contre-indications et précautions d'emploi

En raison de l'effet minéralocorticoïde de la fludrocortisone, la consommation de sel devra être adaptée à la posologie : chez l'enfant, pendant les premières années de vie, une supplémentation sodée (1 à 2 g par jour) est associée à la prise de fludrocortisone.

Une supplémentation en potassium pourra éventuellement s'avérer nécessaire. Un contrôle régulier des électrolytes sériques et de l'activité rénine plasmatique, ainsi qu'une surveillance clinique (tension artérielle, apparition d'œdèmes, prise de poids, fatigue musculaire), sont nécessaires pour réévaluer périodiquement la posologie.

La présence d'une hypertension et/ou d'œdèmes, une tachycardie, une diminution importante de l'activité rénine plasmatique sont autant de signes pouvant traduire un surdosage en fludrocortisone qui doivent conduire à diminuer la dose.

La fludrocortisone doit être utilisée avec précautions chez les patients ayant une hypertension artérielle sévère mal équilibrée et une insuffisance cardiaque sévère.

Le traitement ne doit pas être interrompu sans l'avis du médecin qui suit votre enfant.

Interactions avec d'autres médicaments, aliments, boissons

La fludrocortisone doit être utilisée avec prudence en cas de traitement médicamenteux concomitant avec des anticonvulsivants inducteurs enzymatiques.

Dans tous les cas, si votre enfant prend ou a pris d'autres médicaments, avec ou sans ordonnance, signalez-le au médecin qui le suit.

3. COMMENT UTILISER LA FLUDROCORTISONE ?

Instructions pour un bon usage

Avaler les gélules avec un grand verre d'eau.

Les gélules peuvent être ouvertes et leur contenu mélangé avec un peu d'eau, de lait, de yaourt ou de compote.

Posologie, mode et/ou voie d'administration, fréquence d'administration et durée de traitement

Voie orale.

Concernant la posologie et la durée du traitement, se référer à la prescription médicale de votre enfant.
En cas d'oubli, ne pas doubler la dose.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Description des effets indésirables

Comme tous les médicaments, LA FLUDROCORTISONE est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet, tels que : rétention hydro sodée, hypokaliémie disparaissant après ajustement de la posologie (recherche de la dose efficace la plus faible).

Faiblesse musculaire, crampes, myalgies sont la conséquence clinique de l'hypokaliémie, œdèmes périphériques et prise de poids sont dus à une rétention hydro sodée.

Des céphalées peuvent survenir en rapport avec une augmentation de la tension artérielle.

Une insuffisance cardiaque peut survenir lors de l'initiation du traitement.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER LA FLUDROCORTISONE ?

Conditions de conservation

Conserver à température ambiante.

Conserver au sec.

Tenir hors de portée des enfants.

Péremption

3 mois