

	Fluoxétine	Date de création 9 Janvier 2017
		Version 1
		Page 1 sur 1

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
 Si vous avez des questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
 Ce médicament vous a été personnellement prescrit, ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre.
 Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

1. QU'EST-CE LA FLUOXETINE ET DANS QUEL CAS EST-ELLE UTILISEE ?

Indications thérapeutiques

Traitement des états dépressifs, des troubles obsessionnels compulsifs, de la boulimie, des états dépressifs chez l'enfant de plus de 8 ans en association d'une psychothérapie.

Modalités de prescription

La fluoxétine est une molécule à **usage restreint**, ce qui signifie qu'il est interdit de réaliser des préparations à base de fluoxétine chez l'enfant de plus de 12 ans ainsi que chez l'adulte sauf pour ceux souffrant de dénutrition ou de troubles de la déglutition après attestation médicale afin de réaliser une adaptation galénique et/ou posologique dans le cadre de l'AMM.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER LA FLUOXETINE ?

Contre-indications et précautions d'emploi :

L'effet antidépresseur n'est pas immédiat, un délai de 2 à 4 semaines est nécessaire. Un état anxieux ou des idées suicidaires peuvent apparaître ou s'aggraver en début de traitement notamment chez les patients les plus jeunes (adolescents ou jeunes adultes).

Un arrêt prématuré expose à un risque de rechute. Le traitement ne sera arrêté que sur avis médical et de manière progressive pour éviter les effets indésirables observés en cas d'interruption brutale.

Tous les antidépresseurs sont susceptibles d'induire un épisode maniaque chez les personnes prédisposées. En cas d'euphorie, d'excitation inhabituelle ou de comportement anormal, une consultation médicale est nécessaire.

L'attention est attirée sur la somnolence et les sensations vertigineuses attachées à l'emploi de ce médicament.

Interactions avec d'autres médicaments, aliments, boissons

La fluoxétine ne doit pas être associée avec les médicaments appartenant à la classe des IMAO (des délais très précis doivent être respectés entre les deux traitements : le traitement par fluoxétine sera instauré au moins 14 jours après l'arrêt de l'IMAO, tandis qu'un délai d'au moins 5 semaines est nécessaire entre l'arrêt de la fluoxétine et l'instauration de l'IMAO) ni avec le métoprolol (risque de bradycardie).

La fluoxétine interagit avec beaucoup de médicaments. En effet, la fluoxétine peut modifier l'action d'autres médicaments tout comme certains médicaments peuvent modifier l'action de la fluoxétine et augmenter ses effets indésirables.

Dans tous les cas, si votre enfant prend ou a pris un autre médicament, avec ou sans ordonnance, y compris des produits d'automédication ou de phytothérapie (millepertuis), parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien.

3. COMMENT UTILISER LA FLUOXETINE ?

Instructions pour un bon usage

Avaler les gélules avec un grand verre d'eau.

Les gélules peuvent être ouvertes et leur contenu mélangé avec un peu d'eau, de lait, de compote ou de yaourt.

Posologie, mode et/ou voie d'administration, fréquence d'administration et durée de traitement

Voie orale.

Concernant la posologie et la durée du traitement, se référer à la prescription médicale de votre enfant.

En cas d'oubli, ne pas doubler la dose.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Description des effets indésirables

Comme tous les médicaments, LA FLUOXETINE est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet, tels que : insomnie, maux de tête, nausées, diarrhées, fatigue, perte d'appétit, anxiété, nervosité, rêves anormaux, vertiges, somnolence, tremblements, palpitations, bouffées de chaleur, perte de poids, vomissements, digestion difficile, bouche sèche, troubles du goût, éruption cutanée, douleurs articulaires, saignements.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

La fluoxétine peut être responsable d'un **syndrome sérotoninergique** dont l'évolution peut être grave : si vous remarquez l'apparition de **plusieurs** des effets suivants, contactez votre médecin : tremblements, confusion, agitation, exagération des réflexes, rigidité musculaire, vertiges, fièvre inexplicquée, sueurs.

5. COMMENT CONSERVER LA FLUOXETINE ?

Conditions de conservation

Conserver à température ambiante.

Conserver au sec.

Conserver hors de portée des enfants.

Péremption

3 mois