



## Pyriméthamine

Date de création  
1 Aout 2017

Version 1

Page 1 sur 1

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

Si vous avez des questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit, ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

### 1. QU'EST-CE QUE LA PYRIMETHAMINE ET DANS QUEL CAS EST-ELLE UTILISEE ?

#### Indications thérapeutiques

Ce médicament est indiqué dans le traitement et la prévention de la toxoplasmose en association avec la sulfadiazine.

Il peut cependant être indiqué dans d'autres pathologies, demandez au médecin qui suit votre enfant.

### 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER LA PYRIMETHAMINE ?

#### Contre-indications et précautions d'emploi

Ce médicament est contre-indiqué en cas de :

- D'hypersensibilité à la substance active,
- D'insuffisance rénale ou hépatique sévère.

Une administration de folinate de calcium doit être faite simultanément pour prévenir un déficit en acide folinique sous l'action de la pyriméthamine.

Une numération sanguine (prise de sang) doit être effectuée 2 fois par semaine pendant tout le traitement.

Au cours du traitement, des troubles digestifs tels qu'une perte d'appétit, des nausées, des vomissements ou des douleurs abdominales, peuvent être des signes inauguraux d'un surdosage. En cas de suspicion de surdosage, le médecin vérifiera la posologie et surveillera votre enfant.

Le traitement ne doit pas être interrompu sans l'avis du médecin qui suit votre enfant.

#### Interactions avec d'autres médicaments, aliments, boissons

Eviter, dans la mesure du possible, l'administration simultanée de médicaments inhibant le métabolisme de l'acide folinique (triméthoprime Bactrim®), à l'exception de la sulfadiazine associé dans le traitement.

Si votre enfant prend ou a pris d'autres médicaments, avec ou sans ordonnance, signalez-le à votre médecin ou votre pharmacien.

### 3. COMMENT UTILISER LA PYRIMETHAMINE ?

#### Instructions pour un bon usage

Avaler les gélules avec un grand verre d'eau.

Les gélules peuvent être ouvertes et leur contenu mélangé avec un peu d'eau, de lait, de compote ou de yaourt.

#### Posologie, mode et/ou voie d'administration, fréquence d'administration et durée de traitement

Voie orale.

Concernant la posologie et la durée du traitement, se référer à la prescription médicale de votre enfant.

En cas d'oubli, ne pas doubler la dose.

### 4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

#### Description des effets indésirables

Comme tous les médicaments, LA PYRIMETHAMINE est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet, tels que : anorexie, crampes abdominales, vomissements, tremblements, crises convulsives, modifications de la numération formule sanguine dues à un déficit en acide folinique.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

### 5. COMMENT CONSERVER LA PYRIMETHAMINE ?

#### Conditions de conservation

Conserver à température ambiante.

Conserver au sec.

Tenir hors de portée des enfants.

#### Péremption

3 mois